

25 ЯНВ 2022

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Нобилис® ИЛТ

Разработчик лекарственного препарата: Интервет Интернешнл Б.В., Вим Де Кёрверстраат 35, а/я 31 5830 АА Боксmeer, Нидерланды / Intervet International B.V.; Wim de K rverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands

Номер регистрационного удостоверения: 528-1-6.14-4170№ПВИ-1-1.4/01543

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: торговое наименование: Нобилис® ИЛТ (Nobilis® ИЛТ) международное непатентованное наименование: вакцина против инфекционного ларинготрахеита птиц живая сухая.

2. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления суспензии для окулярного введения.

Вакцина изготовлена из амнион-аллантоисной жидкости и хориоаллантоисных оболочек СПФ-эмбрионов кур, инфицированных живым аттенуированным вирусом инфекционного ларинготрахеита птиц (штамм Serva).

Одна доза вакцины содержит действующее вещество: живой аттенуированный вирус инфекционного ларинготрахеита птиц (штамм Serva) – не менее $2,5 \log_{10}$ ЭИД₅₀ и вспомогательные вещества: панкреатический гидролизат казеина, глицин, натрия хлорид, калия гидрофосфат, динатрия гидрофосфат дигидрат, гентамицина сульфат и воду для инъекций.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой сухую массу от белого до светло-бежевого цвета.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя – 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортировки. Вакцину необходимо использовать в течение 2 часов после вскрытия флакона и растворения. Не применять по истечении срока годности.

4. Вакцина расфасована по 1000 или 2500 доз (по 2 см³ – объем до лиофилизации) в стеклянные флаконы. Флаконы с вакциной укупорены галогенобутиловыми резиновыми пробками, укреплены алюминиевыми колпачками и упакованы по 10 флаконов в картонные коробки с вложением инструкции по применению вакцины на русском языке.

5. Хранить при температуре от 2 до 8°C.

6. Хранить в недоступном для детей месте.

7. Вакцину обеззараживают путем кипячения или сжигания в соответствии с требованиями законодательства. Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина Нобилис® ПЛТ отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Биологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: иммунобиологический лекарственный препарат для ветеринарного применения (вакцина).

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю инфекционного ларинготрахеита птиц через 5-7 суток после двукратного применения, который сохраняется в течение 12 месяцев.

III. Порядок применения

11. Вакцина предназначена для профилактики инфекционного ларинготрахеита у цыплят.

12. Запрещается вакцинировать клинически больную и/или ослабленную птицу.

13. При работе с вакциной Нобилис® ПЛТ следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения.

14. Вакцина не рекомендуется к применению птице в период яйцекладки.

15. Цыплят вакцинируют окулярно дважды: в возрасте 4-6 недель и через 10 недель.

Перед применением 1 флакон вакцины (1000 или 2500 доз) растворяют в 1 флаконе соответствующего объема растворителя Окуло/Назал (30 мл для растворения 1000 доз или 77 мл для растворения 2500 доз). Для этого флаконы с вакциной и растворителем соединяют при помощи прилагаемого пластикового переходника, объединяют и тщательно взбалтывают содержимое. При помощи дозирующей пипетки-аппликатора подготовленную вакцину в объеме ~0,03 мл (1 капля) закапывают на конъюнктиву. Голову цыпленка держат в горизонтальном положении в течение 1-2 секунд.

Допускается растворение вакцины стерильным физиологическим раствором и применение глазных пипеток при проведении вакцинации. Для этого на 1000 голов птицы вакцину растворяют в 50 мл физиологического раствора и при помощи глазной пипетки одну каплю (0,05 мл) наносят на слизистую оболочку глаза.

16. В некоторых случаях может наблюдаться слабо выраженный конъюнктивит, самопроизвольно исчезающий в течение одной недели и не требующий медикаментозного лечения.

17. Патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

18. Не следует применять другие вакцины против инфекционных болезней респираторного тракта в течение 14 дней до и после иммунизации Нобилис® ПЛТ.

19. Особенности поствакцинальной реакции при первичной или повторной иммунизации не выявлены.

20. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики инфекционного ларинготрахеита.

21. Мясо, продукты убоя и яйца, полученные от вакцинированной птицы, можно использовать без ограничений.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения:

Интервет Интернешнл Б.В., Вим Де
Кёрверстраат 35, 5831 AN Боксmeer,
Нидерланды / Intervet International B.V.,
Wim de Körperstraat 35, 5831 AN
Boxmeer, The Netherlands;

Мерк Шарп энд Доум Энимал Хелс
С.Л., С/Цеппелин 6, Полигоно
Индастриал Эль Монтальво I, Парсела
38, Карбахоса-де-ла-Саграда, 37008,
Саламанка, Испания / Merck Sharp &
Dohme Animal Health S.L., C/Zeppelin 6,
Poligono Industrial El Montalvo I, Parcela
38, Carbajosa de la Sagrada, 37008,
Salamanca, Spain.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя:

ООО «Интервет», Россия, 143345,
Московская область, г. Наро-Фоминск,
рабочий поселок Селятино, ул.
Промышленная, дом 81/1.