

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ALPOVET LTD  
Мария Клеантус



ИНСТРУКЦИЯ  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Альпомаст™ Цефти LC

(Организация-разработчик: «ALPOVET LTD», Gordonos, 7B, Agios  
Georgios Chavouzas, P.C. 3070, Limassol, Кипр)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Альпомаст™ Цефти LC (Alpomast Cefti LC).

Международное непатентованное наименование: цефтиофур.

2. Лекарственная форма: суспензия для интрацестерального введения.

Альпомаст™ Цефти LC содержит в одном шприце-дозаторе (10 мл) в качестве действующего вещества цефтиофур (в форме цефтиофура гидрохлорида) – 125 мг; а в качестве вспомогательных веществ: алюминия стеарат и масло соевое.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой масляную суспензию цвета от бледно-желтого до желтого.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года от даты производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Альпомаст™ Цефти LC выпускают в виде стерильной суспензии, расфасованной по 10 мл в одноразовые полиэтиленовые шприцы-дозаторы, закупоренные полиэтиленовыми колпачками. Каждый шприц-дозатор снабжен антисептической салфеткой, пропитанной изопропиловым спиртом. Шприцы-дозаторы упакованы по 8 или 24 штуки в картонные коробки. На упаковке ветеринарного препарата указывают: наименование организации-производителя, ее адрес, товарный знак, название, способ применения и массу лекарственного средства в шприце-дозаторе, количество шприцев-дозаторов (на картонной коробке), название и содержание действующих веществ, номер

серии, дату изготовления, срок годности, условия хранения, надписи «Для ветеринарного применения» и «Стерильно», номер регистрационного удостоверения, предупредительные надписи, условия отпуска, штриховой код.

Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 °С до 25°С.

6. Альпомаст™ Цефти LC следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Альпомаст™ Цефти LC относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы цефалоспоринов.

10. Цефтиофур, входящий в состав лекарственного препарата, является цефалоспориновым антибиотиком третьего поколения, который обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении грамположительных (в том числе *Staphylococcus* spp., включая *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp., *Arcanobacterium* spp.) и грамотрицательных бактерий (в том числе *E. coli*, *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp., *Klebsiella* spp.), включая штаммы бактерий, продуцирующие β-лактамазу и некоторые анаэробные бактерии.

Механизм бактерицидного действия цефтиофура заключается в ингибировании функциональной активности бактериальных ферментов транспептидаз, участвующих в связывании основного компонента клеточной стенки микроорганизмов – пептидогликана, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки.

После введения цефтиофур слабо всасывается в кровь, обеспечивая высокие концентрации в ткани вымени. Активность цефтиофура не снижается в присутствии некротизированных тканей.

Альпомаст™ Цефти LC не оказывает раздражающего действия в тканях вымени.

## III. Порядок применения и дозировка

11. Альпомаст™ Цефти LC применяют для лечения мастита бактериальной этиологии у коров в период лактации.

12. Противопоказанием для применения лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к цефалоспорином, а также к другим бета-лактамам антибиотикам.

13. При работе с препаратом Альпомаст™ Цефти LC следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Альпомаст™ Цефти LC.

Все работы с препаратом Альпомаст™ Цефти LC необходимо проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). Во время работы с лекарственным препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом руки и лицо. При случайном попадании лекарственного препарата в глаза, на кожу или слизистые оболочки его необходимо немедленно смыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Лекарственный препарат предназначен для применения коровам в период лактации.

15. Перед введением лекарственного препарата молоко из поражённой доли вымени необходимо выдоить и утилизировать. Сосок снаружи обрабатывают дезинфицирующей салфеткой, поставляемой с лекарственным препаратом, или 70% спиртовым раствором. После этого канюлю шприца-дозатора аккуратно вводят в канал соска и осторожно, надавливая на поршень, выдавливают все содержимое в поражённую долю вымени. Затем канюлю извлекают, верхнюю часть соска пережимают на непродолжительное время, после чего пальцами массируют сосок снизу вверх.

Альпомаст™ Цефти LC вводят коровам интрацистернально, двукратно, с интервалом 24 часа, в дозе 10 мл (все содержимое одного шприца-дозатора) в поражённую четверть вымени. Перед употреблением следует энергично встряхнуть шприц-дозатор. При необходимости возможна длительная терапия сроком до 8 дней.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Альпомаст™ Цефти LC в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и другое симптоматическое лечение.

17. Симптомы передозировки не установлены.

18. Не следует применять Альпомаст™ Цефти LC совместно с другими лекарственными препаратами для интрацестерального введения. Данные о взаимодействии и совместимости препарата Альпомаст™ Цефти LC с другими лекарственными препаратами отсутствуют.

19. Особенности действия при начале применения лекарственного препарата и его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропусков и увеличения интервалов введения очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы препарата необходимо ввести её как можно скорее. Далее курс применения возобновить в предусмотренных инструкцией, дозе и схеме применения.

21. Использование молока в пищевых целях разрешается не ранее, чем через 96 часов после последнего введения лекарственного препарата.

Молоко, полученное от коров в период лечения и в течение 96 часов после последнего введения лекарственного препарата, полученное из здоровых четвертей вымени, после кипячения может быть использовано в корм животным, молоко из обработанных четвертей вымени обеззараживают и утилизируют.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 4 суток после окончания применения препарата Альпомаст™ Цефти LC.

Наименование и адрес  
производственной площадки  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения

Шизцячжуан Шиму Фармасьютикал Ко.,  
Лтд, Сауз Дистрикт оф Шанчжуан  
Индастри Зоун, Шизцячжуан, Хэбей, КНР  
/Shijiazhuang Shimu Pharmaceutical Co.,Ltd.,  
South District of Shangzhuang Industry Zone,  
Shijiazhuang, Hebei, China

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной владельцем или  
держателем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий  
от потребителя

«АЛЬПОВЕТ ЛТД», Кипр, Лимассол, П.Я.  
3070, Аджос Геоджиос Чевоузэс, 7Б,  
Гордонос / «ALPOVET LTD», Gordonos,  
7B, Agios Georgios Chavouzas, P.C. 3070,  
Limassol, Cyprus.