

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ALPOVET LIMITED
Мария Клеантус



ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Альпомаст™Цефти DC
(Организация-разработчик: «ALPOVET LTD», Gordonos, 7B, Agios Georgios Chavouzas,
P.C. 3070, Limassol, Кипр)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
Альпомаст™Цефти DC (Alpomast Ceftri DC).

Международное непатентованное наименование: цефтиофур.

2. Лекарственная форма: суспензия для интрацестерального введения.

Альпомаст™Цефти DC содержит в одном в шприце-дозаторе в качестве действующего вещества цефтиофур (в форме цефтиофура гидрохлорида)– 0,5 г; а в качестве вспомогательных веществ- алюминия стеарат и масло соевое.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой гомогенную суспензию от белого до бледно-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года от даты производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Альпомаст™Цефти DC выпускают в виде стерильной суспензии, расфасованной по 10 мл в одноразовые полиэтиленовые шприцы-дозаторы, укупоренные полиэтиленовыми колпачками. Каждый шприц-дозатор снабжен антисептической салфеткой. Шприцы-дозаторы упакованы по 24 штуки в картонные коробки. Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Альпомаст™Цефти DC следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Альпомаст™Цефти DC относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы цефалоспоринов.

10. Цефтиофура гидрохлорид, входящий в состав лекарственного препарата, является цефалоспориновым антибиотиком третьего поколения, который обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении грамположительных (в том числе Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Arcanobacterium spp., Fusobacterium spp.) и грамотрицательных бактерий (в том числе E. coli, Salmonella spp., Haemophilus spp., Campylobacter spp., Klebsiella spp., Shigella spp.), включая штаммы бактерий, продуцирующие β-лактамазу и некоторые анаэробные бактерии.

Механизм бактерицидного действия цефтиофура заключается в ингибировании функциональной активности бактериальных ферментов транспептидаз, участвующих в

связывании основного компонента клеточной стенки микроорганизмов – пептидогликана, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки.

После введения цефтиофур поступает в системный кровоток, интенсивно метаболизируется с образованием десфууроилцефтиофура, который обладает эквивалентной цефтиофуру активностью в отношении микроорганизмов. Данный метаболит обратимо связывается с белками плазмы и накапливается в очаге воспаления. Активность цефтиофура не снижается в присутствии некротизированных тканей. Выводится цефтиофур и его метаболиты из организма животного преимущественно с мочой и в меньшей степени с желчью.

Альпомаст™Цефти DC в рекомендованных дозах не оказывает местно-раздражающего действия на ткани вымени.

III. Порядок применения и дозировка

11. Альпомаст™Цефти DC применяют для лечения мастита бактериальной этиологии у коров в сухостойный период, но не позднее 30 дней до предполагаемого отела.

12. Противопоказанием для применения лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к цефалоспоридам.

13. При работе с препаратом Альпомаст™Цефти DC следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Альпомаст™Цефти DC.

Во время работы с лекарственным препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом руки и лицо. При случайном попадании лекарственного препарата в глаза, на кожу или слизистые оболочки его необходимо немедленно смыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Альпомаст™Цефти DC не предназначен для применения в период лактации. Разрешается применение лекарственного препарата сразу после завершения периода лактации перед переводом в сухостойный период, но не позднее 30 суток до предполагаемого отела, в связи с выделением цефтиофура с молоком.

15. Альпомаст™Цефти DC вводят коровам однократно, интрацистернально, сразу после завершения периода лактации, в дозе 10 мл (содержимое одного шприца-дозатора) в пораженную четверть вымени.

Перед введением препарата Альпомаст™Цефти DC необходимо выдоить молоко из поражённой доли вымени. Сосок снаружи обрабатывают дезинфицирующей салфеткой, поставляемой с лекарственным препаратом, или дезинфицирующим средством. После этого канюлю шприца-дозатора аккуратно вводят в канал соска и медленно с осторожностью выдавливают содержимое в поражённую долю вымени.

Затем, канюлю извлекают, верхнюю часть соска пережимают на 1-2 минуты, после чего пальцами массируют сосок снизу вверх.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Альпомаст™Цефти DC в соответствии с настоящей инструкцией как правило не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и другое симптоматическое лечение.

17. Симптомы передозировки не установлены.

18. Не следует применять Альпомаст™Цефти DC совместно с другими лекарственными препаратами для интрацистернального введения, а также с другими лекарственными

препаратами группы аминогликозидов, тетрациклиновой группы, а также фуросемидом и этакридиновой кислотой из-за возможного усиления нефротоксического эффекта.

19. Особенности действия при первом приеме лекарственного препарата и его отмене не выявлено.

20. Альпомаст™Цефти ДСпредназначен для однократного применения.

21. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток после введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Молоко от коров после отела при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией используется без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

Шиззячжуан Шиму Фармасьютикал Ко., Лтд, Сауз Дистрикт оф Шанчжуан Индастри Зоун, Шиззячжуан, Хэбей, КНР /Shijiazhuang Shimu Pharmaceutical Co., Ltd., South District of Shangzhuang Industry Zone, Shijiazhuang, Hebei, China

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

«АЛЬПОВЕТ ЛТД», Кипр, Лимассол, П.Я. 3070, АджииосГеоджиосЧевоузэс, 7Б, Гордонос / «ALPOVETLTD», Gordonos, 7B, AgiosGeorgiosChavouzas, P.C. 3070, Limassol, Cyprus.