

Утверждаю
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А.Власов
« 04 » декабря 2008 г



ИНСТРУКЦИЯ по применению Гамарета интрамаммарной суспензии для лечения мастита у коров в период лактации

(организация - производитель « Bioveta, a.s. » / А.О. « Биовета »,
Чешская Республика)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Гамарет интрамаммарная суспензия (Gamaret intramamarni suspense) - антибактериальное лекарственное средство в форме суспензии для интрацистернального введения, предназначенное для лечения мастита у коров в период лактации.

2. Гамарет интрамаммарная суспензия содержит в каждой индивидуальной упаковке (шприце) в качестве действующих веществ: 100 мг новобиоцина натрия, 105 мг неомицина сульфата, 100000 МЕ прокаин пенициллина, 100 мг дигидрострептомицина сульфата и 10 мг преднизолона, а в качестве вспомогательных веществ алюминия моностеарат и арахисовое масло.

3. По внешнему виду лекарственное средство представляет собой суспензию белого цвета.

4. Выпускают препарат в форме стерильной суспензии, расфасованной по 10 см³ в полимерных шприцах, упакованных по 20 штук в картонные коробки вместе с инструкцией по применению. Каждый шприц и картонную коробку маркируют на русском языке с указанием: организации - производителя, её адреса и товарного знака, названия и объема лекарственного средства в шприце, количества шприцев (на картонной коробке), названия и содержания действующих веществ, способа применения, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, надписей « Для животных » и « Стерильно », номера государственной регистрации и информации о подтверждении соответствия.

Хранят Гамарета интрамаммарную суспензию в закрытой упаковке производителя с предосторожностью (список Б), в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 10 ° С до 25 ° С.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

По истечении срока годности лекарственное средство не должно применяться.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Комплекс антибиотиков (новобиоцин, неомицин, прокаин пенициллина, дигидрострептомицин), входящих в состав препарата, оказывает бактерицидное действие в отношении наиболее часто выделяемых при маститах грамположитель-

ных и грамотрицательных микроорганизмов - Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium и Escherichia. Новобиоцин угнетает синтез клеточной стенки бактерий путем инактивации энзима; неомицина сульфат тормозит белковый синтез на уровне рибосомальной субъединицы 30S, нарушая при этом целостность стенки бактериальной клетки, оказывая, таким образом, бактерицидное действие. Дигидрострептомицин обеспечивает действие лекарственного средства на кишечную палочку, устойчивую к действию неомицина, и одновременно потенцирует действие пенициллина на стрептококковую микрофлору, а преднизолон, входящий в состав препарата, оказывает выраженное противовоспалительное действие, уменьшая отек и болезненность тканей.

6. Гамарет интрамаммарная суспензия по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не проявляет местно-раздражающего действия на ткани вымени.

III ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Гамарета интрамаммарную суспензию применяют для лечения мастита у лактирующих коров, вызванного грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами, включая Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysagalactiae, Streptococcus uberis и Escherichia coli.

8. Перед применением препарата молоко (секрет) из больных четвертей вымени выдаивают полностью и утилизируют. Больную четверть вымени и сосок моют теплой водой с мылом и высушивают стерильной марлевой салфеткой, затем в канал соска вводят канюлю шприца и осторожно выдавливают содержимое. После этого канюлю извлекают, верхушку соска пережимают пальцами и слегка массируют сосок снизу вверх в течение 1-2 минуты для лучшего распределения лекарственного средства. При тяжелом течении мастита введение лекарственного средства повторяют через 24 или 48 часов.

Гамарет вводят интрацистернально:

9. Побочные явления при применении препарата в соответствии с инструкцией не выявлены.

10. Противопоказания к применению Гамарета интрамаммарной суспензии не установлены, за исключением индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам лекарственного средства. В случае индивидуальной чувствительности животных возможно развитие аллергических реакций.

11. Во время лечения молоко, как из больных, так и здоровых четвертей вымени, утилизируют или используют в корм животным после кипячения. Использование молока в пищевых целях разрешается после выздоровления животного и не ранее, чем через 72 часа после последнего введения препарата.

12. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток после последнего введения лекарственного средства. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей или для производства мясокостной муки.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

14. Запрещается использование шприцев из-под лекарственного средства для бытовых целей; они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

15. Гамарета интрааммарную суспензию следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана фирмой «Bioveta,a.s.», Чешская Республика

Организация-производитель фирма «Bioveta,a.s.», Komenskeho 212,
683 23 Ivanovice na Hane, Czech Republic

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-7.8/02591