


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А. Власов
"24" июля 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Отибиовина для лечения наружного отита
бактериальной и грибковой этиологии у собак и кошек

(организация-производитель «Bioveta a.s»/«А.О Биовета»,
Чешская Республика)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Отибиовин (Otibiovin) – лекарственное антибактериальное средство в форме капель ушных, предназначенное для лечения наружного отита бактериальной и грибковой этиологии и поверхностного дерматита у собак и кошек.

2. Отибиовин в качестве действующих веществ в 1 см³ содержит гентамицина сульфат – 2,0 мг, триамцинолон ацетат - 0,5 мг, салициловую кислоту – 5,0 мг, карбетопендицин бромид – 0,125 мг, а в качестве вспомогательных веществ - этанол и воду дистиллированную.

3. По внешнему виду лекарственное средство представляет собой прозрачный, бесцветный раствор. При длительном хранении допускается лёгкая опалесценция или выпадение осадка, которые исчезают при встряхивании и не влияют на эффективность препарата.

4. Выпускают Отибиовин расфасованным по 15 и 20 см³ в полипропиленовых флаконах соответствующей вместимости с крышками-капельницами. Флаконы упакованы поштучно в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

Каждый флакон и коробку маркируют на русском языке с указанием: организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия, лекарственной формы, способа применения и объема лекарственного средства во флаконе, названия и содержания действующих веществ, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, номера государственной регистрации, информации о подтверждении соответствия и надписи "Для животных".

Хранят лекарственное средство в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до 25 °С.

Срок годности Отибиовина при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке - 3 года со дня изготовления, после вскрытия флакона – не более 12 суток.

По истечении срока годности Отибиовин не должен применяться.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Отибиовин, благодаря комбинации активных компонентов с разным механизмом действия, обладает широким спектром антимикробной активности и оказывает противовоспалительное действие в очаге поражения.

Входящий в состав лекарственного средства антибиотик гентамицина сульфат, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая *Micrococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Pneumococcus* spp., а также *E. coli*, *Proteus* spp., *Pseudomonas* spp., *Salmonella* spp.

Салициловая кислота и карбентопендицина бромид обладают антисептическим действием, подавляя рост и развитие бактерий и грибов.

Триамцинолон - синтетический глюкокортикоид способствует снижению воспалительных процессов, заживлению поврежденных тканей, уменьшает зуд и экссудацию в очаге поражения.

При наружном применении лекарственного средства, входящие в его состав компоненты практически не всасываются через кожу и оказывают местное противомикробное действие.

6. Отибиовин по степени воздействия на организм относится к малотоксичным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает кожно-раздражающими и резорбтивно-токсическими свойствами; при попадании в глаза вызывает раздражение.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Отибиовин назначают собакам и кошкам для лечения острого отита бактериальной и грибковой этиологии и поверхностного дерматита (главным образом – otitis externa).

8. Перед применением лекарственного средства ушные раковины и слуховой проход очищают от ушной серы, струпилов и корок, затем закапывают в каждое ухо по 4-5 капель Отибиовина.

С целью более полной обработки всей поверхности ушной раковины и слухового прохода и более глубокого проникновения капель, ушную раковину складывают вдоль и слегка массируют ее основание.

Первые два дня лечения обработку проводят 3-4 раза, а затем 2-3 раза в сутки на протяжении 5-7 дней. Длительность лечения определяется ветеринарным врачом и не должна превышать 12 суток.

9. Для предотвращения разбрызгивания лекарственного средства (если животное трясет головой после его закапывания в ухо) в течение нескольких минут следует фиксировать голову животного.

10. Применение Отибиовина не исключает использование других лекарственных средств специфической и симптоматической терапии, за исключением препаратов для аурикулярного применения.

11. Побочных явлений и осложнений при применении Отибиовина в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к активным компонентам лекарственного средства и появлении побочных явлений использование Отибиовина прекращают.

VI. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. При работе с Отибиовином следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

14. Отибиовин следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана фирмой «ИммКонт ГмбХ» (Германия) совместно «А.О Биовета» (Чешская Республика).

Организация-производитель «Bioveta, a.s.»; Komenskeho 212, 68223 Ivanovice na Hane, Czech Republik.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ "ВГНКИ"

Регистрационный номер ПВИ-2-0,2/01580

Представитель «ИммКонт ГмбХ»
в РФ

С.В. Токарев

ImmCont GmbH
Angermünder Str. 45
D - 16227 Eberswalde
Tel./Fax: 49-3334 383075

[Handwritten signatures]