

ИНСТРУКЦИЯ **по применению препарата ветеринарного «Тилозинокар»**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Тилозинокар (Tilozinosarum).
- 1.2. Препарат представляет собой суспензию красновато-коричневого цвета со специфическим запахом; при хранении разделяется на два слоя, легко перемешивается при встряхивании.
- 1.3. Тилозинокар – комплексный препарат, в 100 см³ содержится тилозина тартрата 1,0 г, Каролина (0,2 % масляный раствор β-каротина) 10,0 см³ и растворителя до 100 см³.
- 1.4. Препарат выпускают в полимерной таре по 500 и 1000 см³.
- 1.5. Тилозинокар хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 до плюс 20 °С по списку Б.
- 1.6. Срок годности 1 год.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1. Тилозинакар обладает широким спектром противомикробного действия, способствует регенерации слизистой оболочки матки, восстановлению сократительной функции матки коров, больных послеродовым гнойно-катаральным эндометритом.
- 2.2. Тилозина тартрат накапливается в достаточно высокой концентрации в полостных органах организма животных, что способствует более эффективному этиотропному действию этого препарата при внутриматочном введении, β-каротин обладает антиоксидантным действием, способствует нейтрализации свободных радикалов, активизирует восстановление сокращений миометрия у животных после родов, способствует сохранению специфичности клеток эпителия половых органов.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- 3.1. Тилозинокар применяют для лечения коров, больных послеродовыми эндометритами. С этой целью препарат предварительно подогревают до температуры 35-40 °С, тщательно взбалтывают содержимое флакона и вводят внутриматочно в дозе 20 см³ на 100 кг массы тела с интервалом 48 часов до выздоровления.
- 3.2. Противопоказания для применения: повышенная чувствительность животных к антибиотикам группы макролидов.
- 3.3. В случае возникновения аллергических реакций препарат следует отменить и назначить препараты кальция и антигистаминные препараты.
- 3.4. Убой на мясо разрешается не ранее чем через 72 часа, а использование молока в пищу людям через 48 часов после последнего применения препарата.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

- 4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать меры личной профилактики, как при работе с малотоксичными препаратами.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная 19А) для подтверждения соответствия нормативным документам.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1. Общество с ограниченной ответственностью «Белкаролин» Республика Беларусь, г.Витебск, пр-т Фрунзе, 81.

Инструкция по применению препарата разработана сотрудником УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» профессором кафедры акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения животных Р.Г.Кузьмичом и сотрудниками ООО «Белкаролин»: начальником ОТК Перловой О.В, начальником производства Губаревичем Д.В.

